



Епидемиология на кожен меланом – къде е България под слънцето на Европа

д-р Надя Димитрова, дм

Български национален раков регистър



Декларация


- Липсват практически взаимоотношения за деклариране



Заболяемост от кожен меланом (КМ) в Европа и България

- В Европа се диагностицират около **100 000** нови случаи годишно
- Относителният дял на пациентите от Централна и Източна Европа е **19%**
- През 2012 г. в България са регистрирани **491** нови случаи, които са:
 - 1.5% от всички злокачествени болести
 - 9.8% от тези на кожа
- Заболяемостта в Европа е **11 на 100 000**
 - Варира от 3 (в Югоизточна Европа) до 24 на 100 000 (в Северна Европа).
 - В България – **4.5 на 100 000**

Заболеваемост от КМ в Европа през 2012 г., общо мъже и жени, www.eco.iarc.fr



Тенденции в заболяемостта от КМ в Югоизточна Европа

Стандартизирана (по световен стандарт на 100 000) заболяемост от кожен меланом в Югоизточна Европа през 2008 г. и тенденции за периода 1999-2008 г.

регион	мъже				жени			
	стандартизиран показател на 100 000		средногодишна промяна (%)		стандартизиран показател на 100 000		средногодишна промяна (%)	
Словения	13,9	В	5,4	↑	15,1	В	7,2	↑
Хърватия	8,7	С	2,2	↑	7,0	С	1,5	↑
Сърбия, централен регион	4,7	С	2,5	↑	4,7	С	2,1	↑
Румъния, област Клуж	5,8	С	–	–	5,1	С	–	–
България	3,4	Н	2,2	↑	3,1	Н	3,0	↑
Турция, Измир	2,4	Н	–	–	–	–	–	–
Турция, Анталия	2,4	Н	10,4	↑	–	–	–	–
Кипър	4,4	С	3,4	↑	4,9	С	2,9	↑
Малта	5,7	С	-2,9	↓	12,9	В	9,9	↑


В - висока; С – средна; Н – ниска заболяемост; стрелки – посока на тенденцията



Смъртност от кожен меланом (КМ) в Европа и България

- В Европа починалите са около **22 000** годишно
- Относителният дял на починалите от Централна и Източна Европа е **36%**
- През 2012 г. в България са починали **163** пациенти, които са:
 - 0.9% от всички причини за смърт от злокачествени болести
 - 46.7% от тези на кожа
- Смъртността в Европа е **2.3 на 100 000**
 - С най-висока смъртност (над 3 на 100 000) са както държави от Северна, така и от Югоизточна Европа
 - В България – **1.8 на 100 000**

Смъртност от КМ в Европа през 2012 г., общо мъже и жени, www.eco.iarc.fr



Тенденции в смъртността от КМ в Югоизточна Европа

Стандартизирана (по световен стандарт на 100 000) смъртност от кожен меланом в Югоизточна Европа през 2008 г. и тенденции за периода 1999-2008 г.

регион	мъже				жени			
	стандартизиран показател на 100 000		средногодишна промяна (%)		стандартизиран показател на 100 000		средногодишна промяна (%)	
Словения	4,0	В	1,4	↑	2,0	В	2,4	↑
Хърватия	3,5	В	0,7	↑	1,8	В	2,8	↑
Сърбия, централен регион	2,7	С	3,3	↑	1,3	С	1,1	↑
Румъния, област Клуж	0,9	Н	–		1,7	С	–	–
България	1,4	Н	2,8	↑	1,1	С	3,7	↑
Турция, Анталия	0,9	Н	–	–	0,8	Н	–	–
Кипър	1,8	С	–	–	0,7	Н	–	–
Малта	2,9	В	-5,3	↓	0,3	Н	7,9	↑

В - висока; С – средна; Н – ниска смъртност; стрелки – посока на тенденцията



Преживяемост от кожен меланом (KM) в Европа и България

- 5-годишна релативна преживяемост:
 - На пациентите от **Европа** – **83%**
 - Варира от **73%** в Източна Европа до **87%** в Централна и Северна Европа
 - С най-висока преживяемост (**над 89%**) са пациентите от Обединено кралство (Северна Ирландия), Исландия, Швейцария и Германия
 - С най-ниска преживяемост (**под 70%**) са пациентите от Литва, Латвия, Полша и България
- На пациентите от **България** – **48.5%**




**Преживяемост (%) от КМ на пациенти,
диагностицирани през периода 2000-2007 г. в
избрани държави и региони в Европа, EUROSCARE-5**

държави	мъже	жени
България	39.7	57.7
Полша	55.2	65.3
Хърватия	64.6	75.4
Словакия	67.7	79.8
Словения	77.1	83.0
Чехия	79.9	84.7
Малта	87.3	86.7
региони	мъже	жени
Източна Европа	69.0	77.2
Южна Европа	77.9	86.1
Централна Европа	84.2	90.2
Северна Европа	82.3	90.7



Тенденции в преживяемостта (%) от КМ на пациенти, диагностицирани през периода 1999-2007 г. по региони в Европа, EUROCARE-5

Относителна преживяемост (%)



Обобщение

1. В България епидемиологичните характеристики на кожния меланом са:

- ниска **заболяемост**, с умерен темп на нарастване;
- ниска **смъртност** при мъжете и средно висока при жените, но и при двата пола има сравнително бърз темп на увеличение;
- сравнително ниска **преживяемост** с тенденция за увеличение, но въпреки това остава доста по-ниска от средната за Европа.

2. Анализът на тенденциите в епидемиологичните показатели за КМ може да се използва при **планиране и мониториране на програми за контрол на болестта.**



БЛАГОДАРЯ